

УДК 517.938

ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛЫХ АВТОКОЛЕБАНИЙ В СИСТЕМАХ С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ

© 2013 М.Г. Юмагулов,¹ Д.А. Якшибаева²

В работе предлагается операторный метод для исследования эффекта возникновения малых автоколебаний в системах с последействием. Метод приводит к новым достаточным признакам бифуркации Андронова – Хопфа, а также позволяет получить приближенные формулы для возникающих решений. В качестве приложения рассмотрена задача о точках бифуркации уравнения Хатчинсона – Райта.

Ключевые слова: бифуркация, динамические системы, системы с запаздыванием, операторные уравнения, функционализация параметра, асимптотические формулы.

1. Постановка задачи

Многие теоретические и практические задачи приводят к дифференциальным уравнениям с последействием, в которых запаздывания зависят от некоторых параметров. В настоящей статье рассматривается функционально-дифференциальное уравнение

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} = & \int_0^{r(\theta)} d_\tau Q(\tau, \theta) x(t - \tau) + \int_0^{r(\theta)} d_\tau R(\tau, \theta) \Phi[\theta, x(t - \tau)] + \\ & + \Psi[\theta, x(t), x(t - v_1(\theta)), \dots, x(t - v_m(\theta))], \end{aligned} \quad (1.1)$$

в котором значение r зависит от скалярного параметра θ . Здесь $r(\theta)$ положительная, непрерывно дифференцируемая функция, $\theta \in [a, b]$, $x \in R^N$, $0 \leq v_j(\theta) \leq r(\theta)$, $v_j(\theta)$ — положительная непрерывно дифференцируемая функция, $j = 1, \dots, m$. $Q(t, \theta)$, $R(t, \theta)$ — квадратные $N \times N$ матрицы, элементы которых при каждом θ являются функциями ограниченной вариации по t на любом конечном промежутке $[\alpha, \beta]$ и при каждом t непрерывно дифференцируемы по θ . Пусть $y = (y_1, y_2, \dots, y_{m+1})$; предполагается, что вектор-функции $\Phi(\theta, x)$ и $\Psi(\theta, y)$ непре-

¹Юмагулов Марат Гаязович (yum_mg@mail.ru), кафедра дифференциальных уравнений Башкирского государственного университета, 450008, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.

²Якшибаева Дина Ахатовна (k_dina_a@mail.ru), кафедра прикладной математики и информационных технологий Сибайского института (филиала) Башкирского государственного университета, 453837, Российская Федерация, г. Сибай, ул. Белова, 21.

рывно дифференцируемы по совокупности переменных и равномерно по θ удовлетворяют условиям

$$\|\Phi(\theta, x)\| = O(\|x\|^2), \|x\| \rightarrow 0, \|\Psi(\theta, y)\| = O(\|y\|^2), \|y\| \rightarrow 0.$$

Здесь и всюду ниже через $\|\cdot\|$ обозначается евклидова норма векторов в пространствах R^N или R^{m+1} ; интегралы в (1.1) понимаются в смысле Лебега – Стильеса. К уравнениям вида (1.1) могут быть сведены многие представляющие интерес уравнения с последействием (см., например, [1–4]).

Система (1.1) имеет решение $x(t) \equiv 0$ при всех значениях θ .

Вследствие изменения параметра θ у уравнения (1.1) могут возникать отличные от нулевого нестационарные периодические решения, имеющие малую амплитуду. В математической постановке такому явлению отвечает бифуркация Андронова – Хопфа [2]. Такая бифуркация хорошо изучена для систем, в которых запаздывание фиксированно, а параметры входят в коэффициенты уравнения. Менее известно результатов для систем, когда параметром является значение запаздывания.

В настоящей работе приводятся новые достаточные признаки бифуркации Андронова – Хопфа для уравнения (1.1), позволяющие построить приближенные формулы для возникающих решений.

2. Переход к операторному уравнению

Наряду с (1.1) будем рассматривать линейное уравнение

$$\frac{dx(t)}{dt} = \int_0^{r(\theta)} d\tau Q(\tau, \theta) x(t - \tau),$$

а также соответствующий ему характеристический квазимногочлен

$$L(p, \theta) = \det \left(\int_0^{r(\theta)} d\tau Q(\tau, \theta) e^{-p\tau} - pI \right).$$

Решение $x(t) = 0$ называют гиперболической точкой равновесия системы (1.1) при $\theta = \theta_0$, если квазимногочлен $L(p, \theta_0)$ не имеет чисто мнимых нулей. В противном случае $x = 0$ называют негиперболической точкой равновесия.

Пусть при некотором $\theta = \theta_0$ решение $x = 0$ является негиперболической точкой равновесия системы (1.1). В этом случае значение θ_0 называют точкой бифуркации уравнения (1.1).

Основные ситуации негиперболичности:

- 1⁰. выполнено равенство $L(0, \theta_0) = 0$, и многочлен $L(p, \theta_0)$ не имеет других чисто мнимых корней,
- 2⁰. при некотором $\omega_0 > 0$ выполнено равенство $L(\pm i\omega_0, \theta_0) = 0$, и многочлен $L(p, \theta_0)$ не имеет чисто мнимых корней вида $\pm k\omega_0 i$, где $k = 0, 2, 3, \dots$

В настоящей работе изучается случай 2⁰. Для $T > r(\theta_0)$ определим семейство матриц

$$V_k(T, \theta) = \frac{T}{2\pi k i} \int_0^{r(\theta)} \exp\left(-\frac{2\pi k i \tau}{T}\right) d\tau Q(\tau, \theta), \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.1)$$

Простым подсчетом устанавливается, что верна

Лемма 1. Условие 2^0 равносильно тому, что, матрица $V_1(T_0, \theta_0)$ имеет простое собственное значение 1, а матрицы $V_k(T_0, \theta_0), k = \pm 2, \pm 3, \dots$ не имеют собственного значения 1.

Рассматриваемый случай 2^0 приводит к бифуркации Андронова – Хопфа. Значение $\theta = \theta_0$ называют точкой бифуркации Андронова – Хопфа системы (1.1), если существуют $\theta_n \rightarrow \theta$ такие, что при $\theta = \theta_n$ уравнение (1.1) имеет нестационарное периодическое решение $x_n(t)$, причем $\max_t \|x_n(t)\| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Отметим, что условие, указанное в случае 2^0 (или в лемме 1), еще не является достаточным признаком бифуркации Андронова – Хопфа. Достаточным признакам бифуркации посвящен ряд работ (см., например, [2; 3]). В настоящей работе предлагается использовать общий операторный метод исследования многопараметрических бифуркаций [5] позволяющий установить достаточные условия бифуркации Андронова – Хопфа. Указанный операторный метод позволяет получить и асимптотические формулы для бифурцирующих решений. Укажем основные этапы применения операторного метода.

На первом этапе осуществляется переход от уравнения (1.1) к операторному уравнению:

$$u(t) = B(T, \theta)u(t) + b(u(t), T, \theta), \quad (2.2)$$

где

$$\begin{aligned} B(T, \theta)u(t) &= u(1) + T \int_0^t \left(\int_0^{r(\theta)} d_\tau Q(\tau, \theta) E\left(\frac{\tau}{T}\right) u(s) \right) ds, \\ b(u(t), T, \theta) &= T \int_0^t \left(\int_0^{r(\theta)} d_\tau Q(\tau, \theta) E\left(\frac{\tau}{T}\right) \Phi[\theta, u(s)] \right) ds + \\ &+ T \int_0^t \Psi \left[\theta, u(s), E\left(\frac{\vartheta_1}{T}\right) u(s), \dots, E\left(\frac{\vartheta_m}{T}\right) u(s) \right] ds; \end{aligned}$$

здесь

$$E\left(\frac{\tau}{T}\right) u(s) = \begin{cases} u\left(s - \frac{\tau}{T} + 1\right), & 0 \leq s \leq \frac{\tau}{T}, \\ u\left(s - \frac{\tau}{T}\right), & \frac{\tau}{T} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Операторы $B(T, \theta)$ и $b(u(t), T, \theta)$ действуют и непрерывны в пространстве $L_2(0, 1)$ при фиксированных θ и T .

Равенство $u(t) = x(t \cdot T)$ устанавливает взаимно однозначное соответствие между T -периодическими решениями $x(t)$ уравнения (1.1) и решениями $u(t)$ уравнения (2.2). Поэтому задача исследования T -периодических решений уравнения (1.1) равносильна задаче о решениях операторного уравнения (2.2).

Лемма 2. Если выполнено условие 2^0 , то оператор $B(T_0, \theta_0) : L_2(0, 1) \rightarrow L_2(0, 1)$ имеет собственное значение 1 кратности 2.

Доказывается лемма несложными вычислениями. Отсюда $e(t)$ и $g(t)$ — линейно независимые функции оператора $B(T_0, \theta_0)$, соответствующие собственному значению 1. Сопряженный оператор $B^*(T_0, \theta_0) : L_2(0, 1) \rightarrow L_2(0, 1)$ также имеет собственное значение 1 кратности 2, которому отвечают собственные функции $e^*(t)$ и $g^*(t)$. Эти функции можно выбрать исходя из соотношений $(e, e^*) = (g, g^*) \neq 0$, $(e, g^*) = (g, e^*) = 0$; здесь $(\cdot, \cdot)$ означает скалярное произведение в $L_2(0, 1)$.

Теорема 1. Пусть выполнено условие 2^0 и соотношение

$$\det \begin{bmatrix} (B'_\theta(T_0, \theta_0)e, e^*) & (B'_T(T_0, \theta_0)e, e^*) \\ (B'_\theta(T_0, \theta_0)e, g^*) & (B'_T(T_0, \theta_0)e, g^*) \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2.3)$$

Тогда значение θ_0 параметра θ является точкой бифуркации Андронова – Хопфа уравнения (1.1).

Здесь B'_θ и B'_T — операторы, полученные дифференцированием оператора $B(\theta, T)$ по θ и T соответственно.

3. Пример: исследование уравнения Хатчинсона – Райта

Данный пункт носит характер приложений приведенной выше схемы к исследованию следующей модификации уравнения Хатчинсона – Райта

$$\frac{dx(t)}{dt} = -\frac{\pi}{2}x(t-\theta)[1+x(t)], \quad \theta \geq 0, \quad (3.1)$$

играющее важную роль в приложениях, в частности, при моделировании динамики биологических популяций [4].

В рассматриваемом примере имеем

$$r(\theta) = \theta, \quad Q(t, \theta) = -\frac{\pi}{2}H(t-\theta), \quad \text{где } H(t) \text{ — функция Хевисайда,}$$

$$\Phi(\theta, x) = 0, \quad \Psi[x(t), x(t-v_1(\theta))] = -\frac{\pi}{2}x(t)x(t-\theta).$$

В рассматриваемом примере матрица (2.1) представляет собой скалярную функцию; тогда из леммы 1 получаем систему

$$\begin{cases} \int_0^{\theta_0} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}\tau\right) d\tau H(\tau-\theta_0) = 0, \\ \int_0^{\theta_0} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}\tau\right) d\tau H(\tau-\theta_0) = \frac{4}{T_0}, \end{cases}$$

которая имеет решение $\theta_0 = 1 + 4n$, $n \geq 0$, n — целое и $T_0 = 4$.

Для проверки указанного в теореме 1 достаточного условия, а также численного исследования бифуркации перейдем от (3.1) к операторному уравнению вида (2.2). Имеем:

$$B(T, \theta)u(t) = u(1) + T \int_0^t \left(\int_0^\theta \left(-\frac{\pi}{2}\right) E\left(\frac{\tau}{T}\right) u(s) d\tau H(\tau-\theta) \right) ds,$$

$$b(u(t), T, \theta) = T \int_0^t \left(-\frac{\pi}{2}\right) \cdot u(s) \cdot E\left(\frac{\theta}{T}\right) u(s) ds.$$

Пусть $\theta_0 = 1$ и $T_0 = 4$. Тогда проверка соотношения (2.3) приводит к равенству

$$\det \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{8} \\ -\frac{\pi}{4} & \frac{\pi}{16} \end{bmatrix} = \frac{\pi}{32}.$$

Таким образом, условия теоремы о бифуркации Андронова – Хопфа выполнены, и, следовательно, число $\theta_0 = 1$ является точкой бифуркации Андронова – Хопфа уравнения (3.1).

Применение схемы из [5] приводит к приближенным асимптотическим формулам:

$$\begin{aligned}\theta(\varepsilon) &= 1 + \varepsilon^2 \left(\frac{1}{10\pi} - \frac{1}{10} \right) + o(\varepsilon^3), \quad T(\varepsilon) = 4 - \varepsilon^2 \frac{2}{5} + o(\varepsilon^3), \\ y(t, \varepsilon) &= \varepsilon \cos 2\pi t + \varepsilon^2 \left(\frac{1}{5} \cos 4\pi t + \frac{1}{10} \sin 4\pi t \right) + \\ &+ \varepsilon^3 \left[\left(\frac{1}{5\pi} - \frac{1}{5} \right) \sin 2\pi t - \frac{4}{5} \cos 2\pi t + \frac{3}{40} \cos 6\pi t + \frac{3}{80} \sin 6\pi t \right] + o(\varepsilon^4),\end{aligned}$$

где $\varepsilon \geq 0$ — вспомогательный малый параметр. Здесь $y(t) = x[t \cdot T(\varepsilon)]$.

Эти формулы означают, что при $\theta = \theta(\varepsilon)$ уравнение (3.1) имеет периодическое решение $x = x(t, \varepsilon)$.

Литература

- [1] Мышкис А.Д. Линейные дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом. М.: Наука, 1972. 352 с.
- [2] Хейл Дж. Теория функционально-дифференциальных уравнений. М.: Мир, 1984. 421 с.
- [3] Хэссард Б., Казаринов Н., Вэн И. Теория и приложения бифуркации рождения цикла. М.: Мир, 1985. 280 с.
- [4] Малинецкий Г.Г. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, синергетика. М.: Наука, 2000. 282 с.
- [5] Операторный метод приближенного исследования правильной бифуркации в многопараметрических динамических системах / А.А. Вышинский [и др.] // Уфим. матем. журнал. 2010. Т. 2. № 4. С. 3–26.

Поступила в редакцию 13/V/2013;
в окончательном варианте — 13/V/2013.

OPERATOR METHOD FOR THE STUDY OF SMALL OSCILLATIONS IN SYSTEMS WITH AFTEREFFECT

© 2013 M.G. Yumagulov³ D.A. Yakshibaeva⁴

This paper proposes operator method for the study of effect of appearance of small oscillations in systems with aftereffect. The method leads to new sufficient features of Andronov – Hopf bifurcation and allows to obtain approximate formulas for emerging decisions. As an application, we consider the problem of bifurcation points of Hutchinson – Wright equation.

Key words: bifurcation, dynamic systems, time-delay systems, operator equations, functionalization of parameter, asymptotic formulae.

Paper received 13/V/2013;

Paper accepted 13/V/2013.

³Yumagulov Marat Gayazovich (yum_mg@mail.ru), the Dept. of Differential Equations, Bashkir State University, Ufa, 450008, Russian Federation.

⁴Yakshibaeva Dina Akhatovna (k_dina_a@mail.ru), the Dept. of Applied Mathematics and Information Technology, Sibai Institute (branch) of Bashkir State University, Sibai, 453837, Russian Federation.